

Złote zasady stosowania inhalatora Braltus

1. Zawsze stosuj lek zgodnie z zaleceniami lekarza.
2. Inhalacje wykonuj tylko w pozycji siedzącej lub stojącej.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Nie stosuj leku po upływie terminu ważności.
5. Przechowuj lek w temperaturze poniżej 25 stopni.
6. Pamiętaj, aby „przed i po” inhalacji zrobić wydech. Nigdy nie rób wydechu do inhalatora.
7. Lek inhaluj do płuc przez usta, nie przez nos.
8. Stosuj lek o tej samej porze każdego dnia. Jest to ważne, ponieważ lek działa przez 24 godziny.
9. Jeżeli pominiesz dawkę leku, przyjmij ją tak szybko, jak to możliwe. Ale nigdy nie przyjmuj dwóch dawek jednocześnie lub w tym samym dniu, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
10. Kapsułkę wyjmij z pojemnika tuż przed inhalacją, a pojemnik szczelnie zamknij. Nie przechowuj kapsułek w inhalatorze.
11. Kapsułki mogą być stosowane tylko wziewnie. Nigdy nie połykaj kapsułek.
12. Kapsułki z lekiem Braltus są przeznaczone wyłącznie do inhalacji za pomocą inhalatora Zonda, dołączonego do opakowania. Nie wolno używać innego inhalatora do podania leku.
13. Wyrzuć inhalator po zużyciu wszystkich kapsułek. Patrz punkt 16.
14. Nie dopuść, aby lek dostał się do oczu. Jeśli tak się stanie, natychmiast przemyj oczy wodą.
15. W razie potrzeby możesz przetrzeć ustnik inhalatora miękką ściereczką. Nie używaj wody do czyszczenia inhalatora.
16. Ochrona środowiska:
 - a/ wyrzuć zużyty inhalator i pojemnik po kapsułkach do inhalacji do żółtego kosza na odpady przeznaczonego dla metali i tworzyw sztucznych,
 - b/ wyrzuć tekturowe opakowanie leku do niebieskiego kosza na odpady papierowe.
17. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania leku.