

Złote zasady stosowania inhalatorów:

Pulmoterol

Budezonid LEK AM

Foramed

1. Zawsze stosuj lek zgodnie z zaleceniami lekarza.
2. Inhalacje wykonuj tylko w pozycji siedzącej lub stojącej.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Nie stosuj leku po upływie terminu ważności.
5. Przechowuj lek w temperaturze poniżej 25 stopni.
6. Pamiętaj, aby „przed i po” inhalacji zrobić wydech. Nigdy nie rób wydechu do inhalatora.
7. Lek inhaluj do płuc przez usta, nie przez nos.
8. Jeżeli pominiesz dawkę leku przyjmij kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie stosuj dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
9. Kapsułki mogą być stosowane tylko wziewnie. Nigdy nie połykaj kapsułek.
10. Kapsułkę wyjmij z blistra tuż przed inhalacją.
11. Kapsułkę przekłuj tylko jeden raz. Nie baw się, nie przekłuwaj kapsułki wielokrotnie by jej nie uszkodzić.
12. W czasie przekłuwania kapsułki istnieje minimalne ryzyko, że kapsułka się rozpadnie. Drobne jej kawałki, po wykonaniu wdechu mogą przedostać się wówczas do jamy ustnej lub gardła. Ponieważ składnik kapsułki jest jadalny, jego spożycie nie jest szkodliwe. By uniknąć rozpadu kapsułki, patrz punkt 10 i 11.
13. W czasie inhalacji, kiedy wykonujesz wdech powinien być słyszalny charakterystyczny dźwięk (furkot). Jeżeli się nie pojawi, może to oznaczać, że kapsułka utknęła w komorze inhalatora. Wówczas otwórz inhalator i usuń kapsułkę. Nie naciskaj przycisków bocznych by usunąć kapsułkę..
14. Po inhalacji otwórz inhalator i sprawdź, czy w kapsułce nie pozostał proszek. Jeżeli go zauważysz wykonaj następną inhalację.
15. Po każdej inhalacji przetrzyj miękką ściereczką ustnik inhalatora. Nie używaj wody do czyszczenia inhalatora
16. Inhalator jest przeznaczony do podania proszku z takiej liczby kapsułek, jaka znajduje się w danym opakowaniu. Nie używaj tego samego inhalatora do innego opakowania leku. Wyrzuć go, patrz punkt 18.
17. Po inhalacji przepłucz jamę ustną wodą i wypłuj ją. Możesz również umyć zęby – zapobiegnie to wystąpieniu pleśniawek lub chrypki.
18. Ochrona środowiska:
 - a/ wyrzuć zużyty inhalator i blistry do żółtego kosza na odpady przeznaczonego dla metali i tworzyw sztucznych,
 - b/ wyrzuć tekturowe opakowanie leku do niebieskiego kosza na odpady papierowe.
19. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania leku.