

## **Złote zasady stosowania inhalatorów:**

**Serevent**

**Seretide**

**Ventolin**

**Flixotide**

1. Zawsze stosuj lek zgodnie z zaleceniami lekarza.
2. Inhalacje wykonuj tylko w pozycji siedzącej lub stojącej.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Nie stosuj leku po upływie terminu ważności.
5. Przechowuj lek w temperaturze poniżej 25 stopni.
6. Metalowy pojemnik zawiera zawiesinę pod ciśnieniem. Nie wystawiaj go na działanie temperatury wyższej niż 50°C, chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie dziuraw, nie pal pojemnika, nawet jeśli wydaje się, że jest pusty.
7. Gdy pojemnik jest zimny działanie terapeutyczne leku może się zmniejszyć. W przypadku oziębienia inhalatora wyjmij metalowy pojemnik z plastikowej osłonki i zanim użyjesz lek przez kilka minut ogrzej go w dłoniach. Nigdy nie stosuj innych sposobów ogrzewania pojemnika.
8. Pamiętaj, aby „przed i po” inhalacji zrobić wydech. Nigdy nie rób wydechu do aparatu.
9. Lek inhaluj do płuc przez usta, nie przez nos.
10. Jeżeli pominiesz dawkę, następną przyjmij o wyznaczonej porze. Nie przyjmuj podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
11. Przed pierwszym użyciem sprawdź inhalator zgodnie z instrukcją. Podobnie, gdy nie lek nie był używany przez tydzień lub dłużej.
12. Czyść inhalator co najmniej raz na tydzień – czyść tylko ustnik, suchą ściereczką.
13. Nie wyjmuj metalowego pojemnika z plastikowej obudowy. Nie zanurzaj go w wodzie.
14. Po inhalacji lekami Seretide i Flixotide przepłucz usta wodą i wypłuj ją. Zapobiegnie to powstawaniu pleśniawek lub wystąpieniu chrypki.
15. Ochrona środowiska:
  - a/ wyrzuć zużyty pojemnik z lekiem do pojemnika na odpady zmieszane,
  - b/ wyrzuć plastikowy inhalator do żółtego kosza przeznaczonego dla metali i tworzyw sztucznych,
  - c/ wyrzuć tekturowe opakowanie leku do niebieskiego kosza na odpady papierowe.
16. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania leku.

